

1. Niech funkcja $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją odwrotną do funkcji $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ zdefiniowanej wzorem $g(x) = x^3 + x$. Podać w postaci uproszczonej wartości pochodnej funkcji f w podanych punktach.

a) $f'(0) = 1$

b) $f'(2) = 1/4$

c) $f'(10) = 1/13$

d) $f'(30) = 1/28$

2. Podać sumę szeregu w postaci liczby całkowitej lub ułamka nieskracalnego:

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sqrt[n]{7} - \sqrt[n+1]{7} \right) = 6$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sqrt[n]{5} - \sqrt[n+1]{5} \right) = 4$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sqrt[n]{3} - \sqrt[n+1]{3} \right) = 2$

d) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sqrt[n]{2} - \sqrt[n+1]{2} \right) = 1$

3. Podać najmniejszą wartość funkcji $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ określonej podanym wzorem.

a) $f(x) = x^4 - 4x^2 + 9$ **5**

b) $f(x) = x^2 + 2x + 4$ **3**

c) $f(x) = x^8 + 8x^4 + 25$ **25**

d) $f(x) = x^6 - 6x^3 + 16$ **7**

4. Podać wartość całki oznaczonej.

a) $\int_0^1 \frac{x^{24} dx}{x^{50} + 1} = \frac{\pi}{100}$

b) $\int_0^1 \frac{x^9 dx}{x^{20} + 1} = \frac{\pi}{40}$

c) $\int_0^1 \frac{x^{10} dx}{x^{22} + 1} = \frac{\pi}{44}$

d) $\int_0^1 \frac{x^{19} dx}{x^{40} + 1} = \frac{\pi}{80}$

5. Niech f będzie funkcją określoną wzorem $f(x) = x^{100} \cdot e^{x^5}$. Podać wartość pochodnej odpowiedniego rzędu funkcji f w zerze.

a) $f^{(200)}(0) = 200!/20!$

b) $f^{(400)}(0) = 400!/60!$

c) $f^{(300)}(0) = 300!/40!$

d) $f^{(500)}(0) = 500!/80!$

6. Podać liczbę liczb zespolonych z spełniających podane równanie.

a) $z^{40} + z^{10} = z^{20} + z^{30}$, **21**

b) $z^{40} + z^{10} = z^{15} + z^{35}$, **26**

c) $z^{40} + z^{10} = z^{13} + z^{37}$, **28**

d) $z^{40} + z^{10} = z^{14} + z^{36}$, **29**

7. Podać pole równoległoboku, którego trzema kolejnymi wierzchołkami są punkty A , $B = (0,0)$ i C .

a) $A = (3,4)$, $C = (4,3)$, **7**

b) $A = (2,3)$, $C = (5,7)$, **1**

c) $A = (1,2)$, $C = (3,4)$, **2**

d) $A = (3,2)$, $C = (5,7)$, **11**

8. Podać takie liczby rzeczywiste a, b , aby macierz A spełniała równanie

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

a) $A = \begin{pmatrix} 7 & a \\ 3 & b \end{pmatrix}$, $a = -16$, $b = -7$

b) $A = \begin{pmatrix} 7 & a \\ 4 & b \end{pmatrix}$, $a = -12$, $b = -7$

c) $A = \begin{pmatrix} 5 & a \\ 3 & b \end{pmatrix}$, $a = -8$, $b = -5$

d) $A = \begin{pmatrix} 5 & a \\ 2 & b \end{pmatrix}$, $a = -12$, $b = -5$

9. Niech $E(n)$ będzie liczbą elementów rzędu n w grupie cyklicznej rzędu $10!$ (dziesięć silnia). Wówczas:

a) $E(25) = 20$

b) $E(18) = 6$

c) $E(16) = 8$

d) $E(22) = 0$

10. Dla podanych rzędów elementów a i b grupy abelowej podać najmniejszy możliwy rząd elementu ab .

a) $r(a) = 14, \quad r(b) = 21, \quad r(ab) = \mathbf{6}$

b) $r(a) = 10, \quad r(b) = 14, \quad r(ab) = \mathbf{35}$

c) $r(a) = 6, \quad r(b) = 10, \quad r(ab) = \mathbf{15}$

d) $r(a) = 6, \quad r(b) = 15, \quad r(ab) = \mathbf{10}$

11. Zdarzenia losowe A , B i C są niezależne. Dla podanych prawdopodobieństw $P(A \cap B)$ i $P(A \cap C)$ podać w postaci ułamka nieskracalnego najmniejszą możliwą wartość, jaką może przyjmować $P(B \cap C)$.

a) $P(A \cap B) = 1/4, \quad P(A \cap C) = 1/8, \quad P(B \cap C) = \mathbf{1/32}$

b) $P(A \cap B) = 1/2, \quad P(A \cap C) = 1/3, \quad P(B \cap C) = \mathbf{1/6}$

c) $P(A \cap B) = 1/2, \quad P(A \cap C) = 1/4, \quad P(B \cap C) = \mathbf{1/8}$

d) $P(A \cap B) = 1/3, \quad P(A \cap C) = 1/5, \quad P(B \cap C) = \mathbf{1/15}$

12. W urnie znajduje się b kul białych i c kul czarnych. Powiemy, że zawartość urny jest cudowna, jeżeli przy losowaniu z urny dwóch kul (losowanie bez zwracania) prawdopodobieństwo, że wylosowano dwie kule różnego koloru, jest równe $1/2$. Dla podanej liczby b podać taką liczbę $c > b$, że opisana wyżej urna jest cudowna.

a) $b = 3, \quad c = \mathbf{6}$

b) $b = 10, \quad c = \mathbf{15}$

c) $b = 15, \quad c = \mathbf{21}$

d) $b = 1, \quad c = \mathbf{3}$